

Korrektionssystemer:

Til afgørelse af placering ved pointligestilling er forskellige korrektionssystemer til rådighed.

Et turneringsreglement bør altid indeholde oplysning om, hvilket system der anvendes til placeringsrækkefølge.

Ligeledes bør turneringsreglementet oplyse, hvorvidt kontante præmier deles ved pointligestilling eller fordeles efter korrektionsberegning. Fordeling af eventuelle ærespræmier bør også fremgå. Selv om der anvendes korrektionsberegning, kan denne stadig give ligestilling, derefter kan anvendes omkamp, lodtrækning.

Sonneborn - Berger

Korrektionen for den enkelte spiller er summen af de modstanderes pointsum, man har vundet over, sammen med halvdelen af de modstanderes pointsum, man har spillet remis med. De modstandere, man har tabt til, tæller således ikke.

Især ved alle mod alle turneringer kan Sonneborn-Berger korrektion anvendes.

Almindelig korrektion

Modstanderens samlede pointsum udregnes, idet de to modstandere med lavest pointsum udelades.

Er der herefter ligestilling, medtages den næstdårligste modstanders pointsum, og ved fortsat ligestilling, den dårligste modstanders pointsum; i begge tilfælde dog kun for de spillere, som havde ligestilling forinden.

Middelkorrektion

For enhver spiller er korrektionen den samlede pointsum af hans modstandere undtagen følgende:

- a. I en turnering med 8 runder eller mindre medtages ikke de to modstandere med den højeste og den laveste pointsum.

Giver dette ligestilling medtages begge disse to modstandere.

- b. I en turnering med 9 til 12 runder medtages ikke de fire modstandere med de to højeste og de to laveste pointsummer.

Giver dette ligestilling udelades kun 2 som i a ovenfor.

- c. I en turnering med 13 runder eller mere medtages ikke de seks modstandere med de tre højeste og de tre laveste pointsummer.

Giver dette ligestilling medtages flere modstandere, først udelades 4 deltagere som i b, derefter udelades 2 som i a.